


# Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina

## Ficha Metodológica

<b>Nombre del Indicador</b>	Tasa de Mortalidad Materna
<b>Descripción Corta del Indicador</b>	Refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.
<b>Relevancia o Pertinencia del Indicador</b>	El riesgo de muerte materna varía en función de las condiciones socio-económicas, tales como: nutrición adecuada, acceso a agua segura y saneamiento, accesibilidad y calidad de servicios de atención en salud.
<b>Categoría</b>	Subsistema: social Indicador de desempeño o desarrollo
<b>Alcance (qué mide el indicador)</b>	Mide la cantidad de muertes maternas en relación a los niños nacidos vivos. No toma en cuenta las defunciones de mujeres embarazadas por causas accidentales o incidentales.
<b>Limitaciones (qué no mide el indicador)</b>	La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.
<b>Fórmula del Indicador</b>	(Cantidad de defunciones por causas maternas acaecidas en la población en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado / la cantidad de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año)*10.000
<b>Unidad de medida</b>	Nº de muertes maternas por cada diez mil nacidos vivos
<b>Definición de las variables que componen el indicador</b>	Defunción por causas maternas / Muerte materna: Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales Nacido vivo: Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.
<b>Cobertura o Escala del indicador</b>	Nacional / Provincial
<b>Fuente de los Datos</b>	Ministerio de Salud. Dirección de Estadística e Información de Salud
<b>Disponibilidad de los Datos (cuantitativo)</b>	Plenamente disponible en formato físico o electrónico
<b>Periodicidad de los Datos</b>	Anual
<b>Período de la serie tiempo actualmente disponible</b>	De 1980 a 2014
<b>Requisitos de</b>	No son necesarios.

<b>coordinación inter-institucionales para que fluyan los datos</b>	
<b>Relación del indicador con Objetivos de la Política, Norma o Metas Ambientales o de DS</b>	La mayor parte de las muertes podrían evitarse si los derechos de las mujeres y los niños estuvieran garantizados, no sólo en cuanto a la atención de la salud sino también a condiciones de vida. El Plan Federal de Salud (Ministerio de Salud y Ambiente, 2004, op cit) con el compromiso de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, establece como meta para el 2007 que la TMM debe disminuir en un 20% en relación con el valor del año 2002.(3,68) Esta meta es coincidente con la propuesta en el ODM VI (Presidencia de la Nación, 2005, op cit) “Mejorar la salud materna”, donde se establece que para 2007, se esperaba alcanzar una tasa de mortalidad materna de 3,7 por cada 10.000 nacidos vivos y 1,3 para el año 2015. Meta también planteada en los ODS.
<b>Relevancia para la Toma de Decisiones</b>	La tasa anual de mortalidad materna resulta de utilidad para la formulación de políticas y la adopción de decisiones sobre accesibilidad y calidad de los servicios de asistencia prenatal y obstétrica.



Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadística e Información de Salud

<b>Descripción y Desafíos</b>	La evolución del indicador mortalidad materna entre 1992 y 2008 se mantiene estable, para alcanzar el mayor valor de la serie en el año 2009. A partir de 2010 presenta una tendencia a la baja, para subir en el último año.
-------------------------------	---